Taxon Asarum europaeum

Název taxonu	Asarum europaeum
Vědecký název taxonu	Asarum europaeum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	kopytník evropský
Synonyma (zahradnicky pou..	Asarum officinale Moench
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aristolochiaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Téměř celá Evropa (kromě nejjižnějších a nejsevernějších oblastí, poněkud vzácnější i na západě kontinentu), západní Sibiř.

Zařazení

Fytocenologický původ	vlhké stinné listnaté lesy, výjimečně smrkové monokultury v nižších polohách, podél potoků, v roklinách na vápencích a bazických podkladech.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina
Výhony	lodyha poléhavá až vystoupavá, chlupatá
Listy	stálezelené, čepel okrouhle ledvinitá, vzácně tupě srdčitá, (3,5-) 5,0 – 6,5 (-7) cm velká, kožovitá, na líci tmavě zelená, silně lesklá až matná, na rubu světle zelená, přitiskle chlupatá nebo lysá
Květenství	okvětí na cca 1cm dlouhé, chlupaté stopce, 10 – 20 mm dlouhé, vně hnědavé, uvnitř fialové, cípy okvětí dovnitř zakřivené,
Plody	tobolka
Semena	semena s bílým masíčkem,
Vytrvalost	dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen

Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	kvetení téměř nepostřehnutelné

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	svěží, čerstvé půdy dobře zásobené vodou; v suchu trpí
Faktor půdy	živinami bohaté, humózní půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh..	celoročně
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	Přistíněné partie skalek, náhrady trávníků na adekvátním typu stanoviště, stinné partie zahrad
Použití	jedovatý, zejména oddenek obsahuje toxickou látku asaron+
Růstové i jiné druhově spec..	sytě zelená barva listu, dobrá pokryvnost taxonu;
Doporučený spon pro výsad..	12-16 ks/m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, dělením trsů

Ostatní

Odkazy

- Sharp, R. Taking Asarum out of the shade. In The Plantsman (New Series), The London: Royal Horticultural Society, 2009. ročník 8, číslo 9 s. 192 - 195. ISSN 0352-4186.
- Kulmann F. Asarum. Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2019. ročník 45, číslo 11, s. 8-12. ISSN 0341-2105

Grafické přílohy