

Taxon *Rheum palmatum*

Název taxonu	<i>Rheum palmatum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Rheum palmatum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	Reveň dlanitá
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Rheum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. severozápadní Tibet, jihovýchodní Sibiř, Středozeří

Zařazení

Pěstitelská skupina Trvalka zatahující a Léčivá rostlina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vysoká 2 m
Kořen	tlustý podzemní kořen větvený do postraních kořenů
Listy	hluboce dlanitě 5-laločnaté s podlouhlými celokrajovými až peřenodílnými laloky
Květenství	lodyha vysoká 2 m, větvená, dutá, lodyžní listy jsou mnohem menší, květenství je mohutná lata
Květy	žlutozelené kvítky
Plody	trojkřídlé nažky
Semena	HTS 12 - 15 g
Vytrvalost	vytrvalá

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nenáročná, listy snesou mrazy do -4 °C
Faktor vody	podzemní voda 1 - 1,5 m pod úrovní půdy, náročná na vodu
Faktor půdy	středně těžké, hluboké, záhřevné, dobře vododržné, pH 5,6 - 7,2, nesnáší zamokřené stanoviště

Užité vlastnosti

Choroby a škůdci skvmitost listů reveně (spůsobuje houba *Ascochyta rhei* a *Ramularia rhei*), hniloba kořenů reveně (houba *Phytophthora cactorum*)

Doporučený spon pro výsad.. přesování sadby 0,25 - 0,3 x 0,25 - 0,3 m, trvalé stanoviště 1,5 - 2 x 0,35 - 0,6 m, nebo 1 x 1 m

Množení

Množení Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(genofond\)](#)