

Taxon *Physocarpus opulifolius* 'Diabolo'

Název taxonu	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo'
Vědecký název taxonu	<i>Physocarpus opulifolius</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Maxim.
Odrůda	'Diabolo'
Český název	tavola kalinolistá
Synonyma (zahradnický pou..)	<i>Spiraea opulifolia</i>
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Physocarpus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: selekce ze semenáčů z roku 1968, Kordes, Německo

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Opadavý, středně až bujně rostoucí, rozložitý keř, dosahuje v 10 letech výšky 1,5 až 2,0 m, ve 20 letech výšky 2,0 až 2,5 m
Výhony	hnědé s popraskanou odlupující se borkou, letorosty lysé
Listy	při rašení vínově červené, později temně fialové, většinou trojlaločnaté, podobné kalině obecné, délka 5 - 7 cm
Květenství	polokulovitý okolík
Květy	12 mm široké, bílé, často bledě růžové
Plody	kožovité měchýřky, po 3-5, celé lysé, na bázi srostlé, červenavé, puchýřnatě nafouklé, 6-10 mm délka
Kůra a borka	odlupující se

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	ve stínu listy méně vybarvují do vínova a zůstávají hnědavě zelené
Faktor tepla	Zóna 3 (do - 40 °C), plně otužilý keř
Faktor vody	prospívá na suchých až mírně vlhkých půdách
Faktor půdy	na půdy nenáročný, pH mírně kyselé až mírně zásadité
Faktor půdy - poznámka	nevysazovat na silně vápenité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez odstraňování slabých výhonů, při bujném růstu provádíme radikální zmlazení - řez silných větví u země

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... v průběhu vegetace
 Použití okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Množení Řízkování, Bylinné řízky a Polovyztřelé řízky
 Množení - poznámka běžně se kultivar množí bylinnými, a dřevitými řízkami, doporučuje se použít rovněž stimulant o 1000 ppm IBA v roztoku, nebo o koncentraci 3000 ppm IBA v talku

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2008
 Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)
- [C. G. Davidson,](#)