

Taxon *Vitis vinifera* Hedvabne zlute

Název taxonu	Vitis vinifera Hedvabne zlute
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Hedvábné žluté´ (HŽ)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Lignan blanc, Lugliencia bianca, Uva Lugliatica, Früher grosser Malvasier, Gelbe Seidentraube, Cibéba bílá
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o starší severoitalskou odrůdu (je známá již od XIV. století), křížení není známo

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyta

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, okrouhlé, tři až pětilaločnaté s hlubšími horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, válcovitě kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká, podlouhle vejcovitá, žlutozelená, při plné zralosti s hnědými skvrnkami na osluněné straně
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé, otevřené, větmější polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité i suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	nejlépe hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	snáší dobře i krátký řez na čípky, na tažních však více plodí
Podnož	pro vyšší tvary do suchších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd T 5C a T 8B

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda (dřívě i stolní) - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	odolnost k houbovým chorobám je střední až vyšší, sprchává
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá až rozplývavá, sladká, velmi jemné muškátové chuti; víno je svěží, odrůdového charakteru
Doporučená technologie vína	burčák, stolní a jakostní vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 103\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

