

# Taxon *Nepeta racemosa*

Název taxonu	<i>Nepeta racemosa</i>
Vědecký název taxonu	<i>Nepeta racemosa</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Lam.</a>
Český název	šanta hroznovitá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Nepeta mussinii</i> Spreng. ex Henckel
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Nepeta</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Kavkaz, Írán, Turecko, u nás místy zplanělá

## Zařazení

---

Fytocenologický původ	suché, slunné kamenité svahy, druhotně podél cest, na stráních, v okolí lidských sídel a zahrad
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Chamaefyt
Životní forma - poznámka	u báze dřevnatí,
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	druh vytvářející husté trsy, vysoké 15-40 cm
Výhony	lodyhy vystoupavé až poléhavé, čtyřhranné, načervenalé, hustě jemně chloupkaté
Listy	spolu s lodyhami našedlé, pýřité, vstříčné, řapíkaté, cca 2-3x2-2,5 cm velké, podélně srdčité, puchýřkaté se zubatým okrajem
Květenství	řídke lichoklasy
Květy	kalich nafialovělý, hustě chlupatý, 5 - cípý, horní kališní lístky zakřivené a o trochu větší než dolní, koruna cca 15 mm, modrá se 2 pysky a skvrnitá. Horní pysk 2 laločnatý, spodní 3 laločnatý s miskovitě rozšířeným středním lalokem.
Plody	tvrška
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Říjen

Doba kvetení - poznámka	dlouhá doba kvetení, kvete v několika fázích,
Remontování	✓
Remontování - poznámka	remontování výrazně podpoří seřezání po odkvětu cca o 1/3 až 1/2

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	výžaduje teplé, slunné stanoviště
Faktor vody	propustné i vysychavé půdy

## Užitné vlastnosti

---

Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	koruny suchých zídek, obruby a lemy, výsadby přírodě blízkého charakteru, větší skalky
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks/m <sup>2</sup>

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Dělení trsů
Odrůdy	např. bíle kvetoucí: 'Alba', 'Snowflake', modře kvetoucí: 'Superba', 'Grog'. V zahradnické praxi častější hybridní odrůdy <i>Nepeta xfaassenii</i> ( <i>N. racemosa</i> x <i>N. nepetella</i> )

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...	jaro, podzim
Odkazy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://botany.cz/cs/nepeta-racemosa/">https://botany.cz/cs/nepeta-racemosa/</a></li> </ul>

## Grafické přílohy

---



