

Taxon Brassica oleracea var. botrytis subv. cultiflora

Název taxonu	Brassica oleracea var. botrytis subv. cultiflora
Vědecký název taxonu	Brassica oleracea var. botrytis subv. cultiflora
Jména autorů, kteří taxon p...	L., L., Alef, L.
Český název	květák
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	convar. botritis var. botritis
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Středomoří, Malá Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Košťálová zelenina
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro zdužnatělé fasciované květenství

Popisné a identifikační znaky

Kořen	slabý kořenový systém
Plody	šešule
Semena	HTS 3 - 5 g
Vytrvalost	jednoletý

Doba zrání

Začátek doby zrání Květen
Konec doby zrání Říjen
Doba zrání - poznámka sklizeň : Raný 20.V. - 15.VI., Letní 15.VII. - 15.VIII., Pozdní IX. - X.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor tepla optimální teplota pro růst 12 - 18°C, klíčení 15 - 20°C
Faktor vody nutná pravidelná doplnková závlaha
Faktor půdy humózní půdy biologicky činné, hlinité, vododržné, podzimní odrůdy na řepařské půdy, pro rané kvěťáky lehčí, záhřevné písčitohlinité půdy, pH 6,8 - 7,5

Užité vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	vyslepnutí kvěťáku zúůsobené nedostatkem molybdenu, propadání a hnědnutí středu růžic, antokyazace růžic kvěťáků, mechovatění růžic kvěťáku, zlistnatění růžic kvěťáku, vyrová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i>), plíseň brukvovitých (<i>Peronospora parasitica</i>), alternáriová skvrnitost brukvovitých (<i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i>), květílka zelná (<i>Delia radicum</i>), mšice zelná (<i>Brevicoryne brassicae</i>), dřepčik (<i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec (<i>Ceutorhynchus</i>), bělásek zelný (<i>Pieris brassicae</i>), bělásek řepový (<i>P. rapae</i>), můra zelná (<i>Mamestra brassicae</i>), můra kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>), osenice polní (<i>Agrotis segetum</i>), zápnředníček polní (<i>Plutella xylostella</i>), molice vlašťovičnicková (<i>Aleyrodes proletella</i>), bejlmorka zelná (<i>Contarinia nasturtii</i>), třásněnka (<i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	rané 0,4 x 0,4 m, letní 0,5 x 0,5, pozdní 0,5 - 0,6 x 0,5 - 0,6 m, ozimé 0,4 x 0,4 - 0,5 m

Množení

Množení Přírný výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)