

Taxon *Prunus armeniaca* 'Rakovského'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Rakovského'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Rakovského'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Slovensko, 1954

Zařazení

Fytopcenologický původ nahodilý semenáč
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus koruna vznosná, později rozkleslá
Květy středně velké, kulovitě oválné, slupka sytě oranžová, krycí barva tmavě červená až fialová, lákavá, povrch je hladký a matný, dužnina sytě oranžová, jemná, dobrá, odlučitelná od pecky

Doba zrání

Doba zrání - poznámka dozrává 5 dní po odrůdě 'Velkopavlovická', středně raná

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vyžaduje dobré stanoviště
Faktor půdy vyžaduje půdy dobře zásobené živinami a vláhou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení polokmen, čtvrtkmen
Podnož M-VA-1 až M-VA-3, M-LE-1, 'St. Julien A' a MY-KL-A

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci proti napadení hnědnutí listů nízká, k nízkým teplotám střední, za deště plody často pukají a jsou napadány moniliózou

Růstové i jiné druhově spec..	růst bujný, mírně spurtypový
Plodnost	velká, méně pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Staniční zkouška 18\)](#)

Ostatní

Poznámka	Pro svůj líbivý vzhled plodů je oblíbená především u drobných pěstitelů. Plody má atraktivní červené se sytě oranžovou dužninou a velmi dobrou chutí. Je náchylná na pukání a moniliózu plodů za dešťů.
----------	---

Grafické přílohy

