

# Taxon *Prunus armeniaca* 'Shajinhong Sin'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Shajinhong Sin'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Odrůda	'Shajinhong Sin'
Český název	meruška obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Čína

## Zařazení

Fytcenologický původ 1200 let stará odrůda  
Pěstitelská skupina Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

Habit us koruna rozkladit á  
Opylovací poměry Cizosprašná  
Plody oválné, zlatočervené (50-75% tvoří líčko), průměrná hmotnost 60 g (v extrému až 100 g), velmi atraktivní, snadná odlučitelnost, refrakce 12° Brix, poměr kyselin a cukrů vyvážený

## Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka začátek až střed května

## Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec června až začátek července, střední (skladovatelnost 6-7 dní při pokojové teplotě), vývoj plodu trvá 67 dní

## Nároky na stanoviště

Faktor tepla nesnáší chladné teploty

## Užitné vlastnosti

Použití vhodná k transportu  
Plodnost poprvé plodí v 7 letech po výsadbě

## Množení

---

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -  
Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka Nejvíce se pěstuje v oblasti v Číně, v provincii Shanxi (nejznámější oblast Qingxu County - 89% výnosů). Doporučeno je pěstovat odrůdu v provincii Liaoning, nevhodná do oblastí s příliš chladným počasím (Shenyang).