Taxon Prunus armeniaca ´Shajinhong Sin´

Název taxonu	Prunus armeniaca ´Shajinhong Sin´
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	´Shajinhong Sin´
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Čína

Zařazení

Fytocenologický původ	1200 let stará odrůda
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna rozkladitá
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	oválné, zlatočervené (50-75% tvoří líčko), průměrná hmotnost 60 g (v extrému až 100 g), velmi atraktivní, snadná odlučitelnost, refrakce 12° Brix, poměr kyselin a cukrů vyvážený

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	začátek až střed května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec června až začátek července, střední (skladovatelnost 6-7 dní při pokojové teplotě), vývoj plodu trvá 67 dní

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	nesnáší chladné teploty

Užitné vlastnosti

Použití	vhodná k transportu
Plodnost	poprvé plodí v 7 letech po výsadbě

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad (Genofond meruněk)

Ostatní

Poznámka	Nejvíce se pěstuje v oblasti v Číně, v provincii Shanxi (nejznámější oblast Qingxu County - 89% výnosů). Doporučeno je pěstovat odrůdu v provincii Liaoning, nevhodná do oblastí s příliš chladným počasím (Shenyang).