

Taxon *Sorbus aria*

Název taxonu	Sorbus aria
Vědecký název taxonu	Sorbus aria
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	jeřáb muk
Synonyma (zahradnický pou..	Crataegus aria L., Mespilus aria Scop., Pirus aria Ehrh.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Sorbus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř, někdy strom
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř, řidčeji strom, často vícekmenný, 3 – 9 (15) m vysoký, koruna hustá, vejčitá až široce kuželovitá
Výhony	zpočátku šedobíle plstnaté, později světle hnědé až hnědé, olysávající, lesklé
Pupeny	delší než 9 mm, vejčité, olivově zelené až hnědavé, okraj šupin hnědý, bíle plstnatý
Listy	jednoduché, 6 – 12 x 5 – 9 cm, široce eliptické až okrouhlé, někdy mělce peřenolaločné, laloky max. do 1/6 šířky poloviny čepele, vrchol špičatý nebo tupý, báze okrouhlá, líc tmavě zelený, zpočátku plstnatý, později lysý, lesklý, rub hustě bělavě plstnatý, řapík do 2 cm
Květy	do 12 cm v průměru, vřeteno plstnaté, později pouze výjimečně olysávající, květy do 1,8 cm v průměru, kalich hustě plstnatý, petaly bílé, široce eliptické až okrouhlé
Plody	malvice, do 15 mm dl., kulovité, vejčité až eliptické, světle až tmavě červené, kalich vytrvalý
Kůra a borka	v mládí šedočerná s bílými lenticelami, později podélně rozpraskaná
Možnost záměny taxonu (+..	<i>Sorbus intermedia</i>

Dlouhověkost krátkověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen
Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Doba zrání - poznámka plodí v září

Nároky na stanoviště

Faktor světla vyhovující je slunné stanoviště, jen v mládí snese mírné přístínění
Faktor světla - slunce ✓
Faktor tepla teplomilná dřevina, oblasti I-II, na vápencích až III, na vlhčích půdách namrzá, jinak zimovzdorný
Faktor vody vyhledává suché až čerstvé půdy
Faktor půdy upřednostňuje hluboké, živné a propustné půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... na podzim oranžově až žlutě barvící
Použití - pro trvalky OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití jako solitera, zvláště var. magnifica, ale i do alejí a do řídkých skupin
Růstové i jiné druhově spec.. strom s hustou a těžkou, poměrně pravidelnou korunou, sivým rubem listů, na podzim oranžově až žlutě barvící

Množení

Množení Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka slouží jako podnož pro druhy s nezpeřenými
Odrůdy 'Aurea' - výhony bíle plstnaté, na podzim listy zlatožluté;
'Magnifica' - koruna úzce kuželovitá, později širší. Listy velké, líc tm. zelený, rub bíle plstnatý, plody málo nápadné; 'Quercoides' - koruna malá, hustá, list eliptický, peřenolaločný až peřenoklaný

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)

