

Taxon *Ageratum houstonianum*

Název taxonu	Ageratum houstonianum
Vědecký název taxonu	Ageratum houstonianum
Jména autorů, kteří taxon p...	Miller
Český název	nestařec americký
Synonyma (zahradnický pou..	Carelia houstoniana (Mill.) Kuntze
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ageratum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Karibská oblast a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Mexiko, Guatemala, Brazílie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá
Pěstitelská skupina - pozná..	předpěstování: výsev 0,5 g na 1000 r., I - III, klíčení, 10 - 14 dní při 18 - 21 °C , nezasypávat, přepichování II - IV do 9 cm, květináčů, 16 °C, kult.doba 3 - 4 měsíce
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	běžná, oblíbená letnička, kvetoucí od výsadby do zámrazu, odkvetlé úbory se ztrácejí pod nově nakvétajícími z čeho vznikl i český název, spon u nízkých cca 20 x 20 cm u vysokých 30 x 30 cm

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nepravá bylinná letnička se vzpřímeným růstem různé výšky podle odrůd, lodyhy i listy měkce přité, list vstříčný, čepel v obrysu trojúhelníková, okraj hrubě vroubkovaný
Výhony	lodyha přímá, nevětvená, chlupatá, 12 - 60 cm vysoká
Listy	vstříčné, řapíkaté, okraj hrubě vroubkovaný
Květenství	úbory s niťovitými jazykovitými květy v hustých koncových květenstvích
Květy	pouze trubkovité, bílé, modré, modrofialové, růžové
Plody	nažka
Semena	velice drobná

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
----------------------	----------

Konec doby kvetení Říjen
Doba kvetení - poznámka nová květenství přerůstají květenství odkvétající

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Užité vlastnosti

Použití nízké odrůdy na záhony, lemy a obruby, nádoby, hrobová pole, hrnková kvetoucí k dočasné výzdobě interiéru brzy na jaře, vysoké na záhony, k řezu (i komerčně na květinových burzách)

Množení

Množení Předpěstování sadby

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2006

Grafické přílohy

