

Taxon Vitis vinifera Acolon

Název taxonu	Vitis vinifera Acolon
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Acolon´ (Ac)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	We 71-816-102
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o německou odrůdu, vznikla ve Weinsberku křížením odrůd ´Frankovka´ a ´Dornfelder´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, špičaté
Listy	velké až velmi velké, klínovité, pětilaločnaté s výraznými horními výkroji, bazální výkroj je otevřený, lyrovitý; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký kuželovitý hrozen, středně hustý; má menší kulaté bobule, modročerné barvy
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano

Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vhodné jsou i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či Börner, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína či rosé, přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 9-13 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je podobné spíše Frankovce, má ovšem vyšší barvu i tríslovitost
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, je vhodná i pro barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 91\)](#)

Grafické přílohy

