

Taxon *Prunus armeniaca* 'Bergeron'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Bergeron'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Bergeron'
Český název	meruňka obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Gabrielle Bergeron'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Francie, Saint-Cyru-Mont-d'Or

Zařazení

Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna vzrůstná, později rozložená
Listy	kulovitě protáhlé, ušlechtilého vzhledu, matné
Květy	bílé, drobné, nenápadné, okrouhlé, blizna v úrovni prašníků, 1 pestík na 25 tyčinek
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	střední až větší (40-45 g), kulovitě oválné, oranžově žluté se světle červeným tečkovaným líčkem, plody nepřezrávají a dobře se přepravují

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka střední (současně s VP)

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 5-8 dní po odrůdě Velkopavlovická, pozdní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vhodná pro typické meruňkářské oblasti, středně náročná na stanoviště, vysoce odolná proti mrazům ve dřevě i v pupenech v době květu

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	čtvrtkmen s centrálním výhonem
Řez	náročnější na řez, vhodný pečlivější výchovný řez
Podnož	M-VA-1 až M-VA-4, M-LE-1

Užitné vlastnosti

Použití	konzervárenství
Choroby a škůdci	málo až středně odolná proti monilióze, citlivá k šarce
Růstové i jiné druhově spec..	středně vzrůstná
Plodnost	brzká, velká a pravidelná (při přeplození nutná probírka)

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

