

Taxon *Buddleja davidii*

Název taxonu	<i>Buddleja davidii</i>
Vědecký název taxonu	<i>Buddleja davidii</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Franch.
Český název	komule Davidova, komule proměnlivá
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Buddleja

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	štíhle vystoupavý, řídkce a nepravidelně stavěný keř, výška 50-500 cm
Výhony	letorosty až 2 m dlouhé, bělavě plstnaté
Pupeny	vstříčné
Listy	listy (vejčitě) kopinaté, 4-25 cm, tmavě zelené, hustě pilovité, rub jemně šedě plstnatý, báze klínovitá, vrcholek zašpičatělý, 9-14 párů žilek, drží dlouho do zimy
Květenství	vzpřímená, štíhlá lata 4-30 cm
Květy	na letorostech, barva dle odrůdy: od bílé - růžové - fialové vínové po temné odstíny, přitahují motýly
Plody	2pouzdré tobolky s četnými drobnými semeny
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor světla - poznámka	spíše slunná
Faktor tepla	u nás výhony v zimně hluboko namrzají, je utná zimní příkrývka, oblast I(II)
Faktor vody	nenáročná, ale nemá ráda vlhčí půdy
Faktor půdy	živné ne příliš vlhké půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez nutné na jaře odstranit hluboko namrzlé výhony až na zdravé dřevo

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VII - VIII - květ
Použití	vysazujeme buď jednotlivě nebo do skupin, atraktivní keř - vábí svými květy motýly
Choroby a škůdci	netrpí

Množení

Množení Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky