

Taxon *Vitis vinifera* Picurka

Název taxonu	Vitis vinifera Picurka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Picurka´ (Pi)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	CRDE 5/9
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Damascenka růžová (Ceaus rozovyj)´ x ´Delight´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní bezsemenná odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyžívající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, výrazněji pětilaločnaté, řapíkový výkrojek je lyrovitý, překrytý; čepel listu je lehce vrásčitá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký, kuželovitý, hustší hrozen; bobule je středně velká, elipsovitě protáhlá do špičky, zelenká s růžovým líčkem
Semena	rudimentální (bezsemenná odrůda)
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Srpen
Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	nevhodné jsou příliš suché a písčité půdy
Faktor půdy	nejlépe hlinité či hlinitopísčité vlhčí půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnoží	na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní bílá bezsemenná odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, sprchává
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 5-10 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, neutrální sladší chuť

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 93, 133\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

