

# Taxon *Clivia miniata*

Název taxonu	Clivia miniata
Vědecký název taxonu	Clivia miniata
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Regel (1864)</a>
Český název	řemenatka červená; klívie oranžová
Synonyma (zahradnický pou..	Clivia sulphurea Laing; Imantophyllum miniatum Hook.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Clivia</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, oblast Namibie a Karoo, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - po..	Rod - východní pobřeží jižní Afriky - subtropická oblast mezi Kapskem a Transvaalem; <i>C. miniata</i> : Kwazulu - Natal

## Zařazení

Fytocenologický původ	Stanoviště se může lišit od subtropického pobřežního lesa po rokle ve vysokohorském lese. Roste ve stínovaném stínu, často ve velkých koloniích.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Hemikryptofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	40-50 cm vysoká kvetoucí rostlina s cibulovitě ztlustlou bází zkráceného stonku
Kořen	dužnatě ztlustlé kořeny
Listy	řemenité až čárkovité, obloukovitě prohnuté, dvouřadě uspořádané; pevné až kožovité, obloukovitě odstávající od květního stvolu
Květenství	okolík; 12-20 ks květů
Květy	nálevkovité, červené nebo oranžové se žlutým ústím; kultivary často s barvou žlutou nebo krémovou
Vytrvalost	vytrvalá rostlina
Dlouhověkost	velmi dlouhověká

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	odkvetlé stvoly odříznout, aby nevyčerpávaly rostlinu; během kvetení se rostlina nemá otáčet nebo přenášet

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla	světlo, polostín až stín, ne na přímé slunce; přes léto lze pěstovat venku na přistíněném místě
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	v zimě teplota (8-)15-18 °C; vyžaduje přezimování při nižších teplotách
Faktor vody	v létě pravidelná závlhka, v zimě na chladném místě udržovat v suchu
Faktor půdy	humózní substrát s podílem zahradní zeminy, pH 6,0 - 6,8; rostliny přesazovat nejdříve po 2-3 letech po odkvětu

## Užité vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	výrazná solitérní kvetoucí rostlina; jedna z nejtolerantnějších kvetoucích rostlin do tmavého a chladného interiéru
Choroby a škůdci	vlnatka, puklice, červci; při nadměrné vlhkosti hnědé špičky listů; přímé slunce působí popáleniny na listech; světlé listy a nedostatečná tvorba odnoží z nedostatečné výživy
Růstové i jiné druhově spec..	vytékající mléčná šťáva je jedovatá

## Množení

---

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Množení oddělky
Množení - poznámka	odnože nejméně se čtyřmi listy
Odrůdy	'Citrina' - žlutobílý kultivar; 'Burvenich', 'Striata' - pestrolistá odrůda; 'Abigail', 'Aurea', 'Doris', 'Jenny', 'Lemon Chiffon', 'Lemon Ice', 'Little Charm', 'Sabrine Delphine', 'San Marcos Yellow', 'Solomone Yellow', 'Tiny Tim', 'Vico Yellow'

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(chladný skleník\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/1201292?tab=references>

## Grafické přílohy

---

