

# Taxon *Paeonia suffruticosa* 'Hatsugarasu'

Název taxonu	<i>Paeonia suffruticosa</i> 'Hatsugarasu'
Vědecký název taxonu	<i>Paeonia suffruticosa</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Andrews</a>
Odrůda	'Hatsugarasu'
Český název	pivoňka keřovitá
Synonyma (zahradnicky pou..	<i>Paeonia arborea</i> Donn, <i>Paeonia moutan</i> Sims
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Paeonia</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	první známé dokumenty o tomto kultivaru pocházejí z roku 1929 z Japonska, ale tato odrůda byla vyšlechtěna již před 1929, šlechtitel neznámý

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý a Léčivá rostlina
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně vysoké rostliny, vzpřímené, polosloupovité, výška do 1,5 m, řidce větvený, pomalu rostoucí
Kořen	ztlustlý, hlízovitý
Výhony	štíhlé ve srovnání s původním druhem, lysé, dřevnaté
Pupeny	velké, střídavé
Listy	střídavé, 2 x trojčetné, dlouhé, malé, řídké, lístky eliptické, až vejčité, terminální lístek nepravidelně zubatý, tmavě zelené s načervenalým nádechem
Květenství	jednotlivě, postranní
Květy	velké, kompaktní, poloplné, tmavě červené, v průměru 15 - 20 cm x 6 cm, na dlouhé stopce
Plody	měchýřek, podlouhlý, plstnatý, dřevnatějící
Semena	semena až do 10 mm velká, lesklá, tmavá
Kůra a borka	šedohnědá
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Remontování	✓
Remontování - poznámka	možnost remontování v srpnu

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	zóna 5-6, mrazuvzdorná
Faktor vody	ne zaplavované, podmáčené půdy
Faktor půdy	neutrální

## Užitné vlastnosti

Použití	okrasný keř - solitera, skupiny, podrost, léčivá rostlina
Choroby a škůdci	Plíseň pivoňková ( <i>Botrytis paeoniae</i> ), Cladosporiová listová skvrnitost a červená stonková skvrnitost ( <i>Cladosporium paeoniae</i> ), Septoriová listová skvrnitost ( <i>Septoria paeoniae</i> ), Hniloby kořenů

## Množení

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Kořenové řízky, Hřížení, Dělení trsů, Roubování, Roubování - Kozí nožka a Roubování - Do rozštěpu
Množení - poznámka	výsev semen hned po sběru, jinak přeléhání 1-3 roky - nutná stratifikace
Květní tvorba	potřebuje nízké teploty
Odrůdy	Dle původu odrůd - Japonské, Čínské, Evropské, Americké, Dle tvaru květu: Jednoduchý typ, Poloplný typ (lotosové, chryzantémové), Japonský typ (květ zlatého středu, vlastní japonský, sankovitý), Plný typ (růžovitý, bombovitý, zlatého kruhu, kulovitý)

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

## Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2007

Výsev/výsadba na stanoviš... březem-dubem, místo roubování 5 - 10 cm pod povrchem půdy,  
výsadba - šikmo, výměna substrátu, úprava PH

## Grafické přílohy

