

# Taxon *Caragana frutex*

Název taxonu	Caragana frutex
Vědecký název taxonu	Caragana frutex
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(L.) K. Koch</a>
Český název	čimišník křovitý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Caragana</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Východní Evropa, Kavkaz, Střední Asie, Mongolsko

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce ažploše kulovitý a hustě větvený výběžkatý keř
Výhony	výhon hnědý
Pupeny	pupeny šedé
Listy	sudospeřené, větveno někdy tmovatí
Květy	žlutý, po 1 na stopečce, 2 cm
Plody	lusk

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce
Faktor tepla	teplomilná, oplast I-III
Faktor vody	sušší půda
Faktor půdy	lehká, suchá a na živiny nepříliš bohatá půda

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez netvaruje se

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického... V-VI - květ  
Použití keřové skupiny  
Choroby a škůdci netrpí

## Množení

---

Množení Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Hřížení a Roubování  
Množení - poznámka množíme semenem nebo i úspěšně zelenými řízky, kultivary můžeme roubovat na *C. arborescens*, např. pro dosažení stromkovitého tvaru  
Odrůdy Pendula' - vzácněji poléhavě plazivý, těsně při zemi přitisklý, nejčastěji je však pěstován jako nízký stromek s převisajícími větvemi