

Taxon Cucurbita pepo convar. giromontiina

Název taxonu	Cucurbita pepo convar. giromontiina
Vědecký název taxonu	Cucurbita pepo convar. giromontiina
Jména autorů, kteří taxon p...	Greb.
Český název	cuketa
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	convar. Giromontiina
Nadřazená kategorie	Cucurbita

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Amerika

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nár... teplomilná zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	převážně keříčkový
Výhony	stonek hranný
Listy	dlanité, často s bílými skvrnami
Květy	žlutá až oranžová koruna
Plody	stopka plodů hranná, tvrdá, různá barva pokožky: zelená, žíhaná, žlutá, bílá
Semena	bíla s okrajem, HTS 130 - 160 g
Vytrvalost	jednoletá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen
Konec doby kvetení Zář

Doba zrání

Začátek doby zrání Červen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor půdy humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí, písčitohlinité, hlinité, pH 6,5 - 7,5

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), antraknóza tykvovitých (Colletotrichum lagenarium), šedá hniloba, květílka všežravá (Hylemyia platura)

Množení

Množení Přímý výsev

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)