

Taxon *Symphoricarpos albus*

Název taxonu	<i>Symphoricarpos albus</i>
Vědecký název taxonu	<i>Symphoricarpos albus</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) S. F. Blake
Český název	pámelník hroznatý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>S. pauciflorus</i> Britton, <i>S. racemosus</i> Michx.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Symphoricarpos

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	východ Severní Ameriky

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce polokulovitě rozložený keř, jemně a hustě větvený, výška až 150(-200) cm
Výhony	letorosty tenké, zelené a jemně chlupaté
Pupeny	vstřícné
Listy	listy okrouhle vejčité, oválné nebo oválně podlouhlé, 1-8 cm dlouhé, špičaté, na dlouhých výhonech často laločnaté, svrchu tmavě zelené, naspodu světlejší a měkce chlupaté, řapíky 2-7 mm
Květenství	květy v koncových a postranních klasech nebo svazečcích
Květy	koruna zvonkovitá, 5-7 mm dlouhá, červenavě bílá či růžová, trubka uvnitř chlupatá, tyčinky nevyniklé
Plody	plody vejcovitě okrouhlé či vejcovité, sněhobílé až jemně narůžovělé, 8-15 mm tlusté, v hustých svazečcích

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	oblast až IV
Faktor vody	nenáročný, nesnese jen přemokření
Faktor půdy	nenáročný

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez řez snáší dobře, lze tvarovat

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VI-VIII - květ, později plody
Použití	skupiny keřů, volně rostoucí i tvarované živé ploty, podrost
Choroby a škůdci	v teplých oblastech mšice

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka	množení semeny či dřevitými řízky řezanými začátkem zimy
Odrůdy	var. <i>Laevigatus</i> - výška až 2 m, letorosty lysé; listy vejčité, téměř lysé, nejčastěji trochu větší, na dlouhých výhonech laločnaté; květy v krátkých hroznech, korunní ušty tak dlouhé jako trubka, růžové až bílé