

# Taxon *Vitis vinifera* Kodrjanka

Název taxonu	Vitis vinifera Kodrjanka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Kodrjanka´ (Kod)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	VII-24-15, Kodrijanka
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Moldova´ x ´Maršalskij´

## Zařazení

---

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	modrá stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, zašpičatělé
Listy	středně velké, pětilaločnaté, s hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je lehce vrásčitý, vespod mírně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký hrozen, kuželovitý, středně hustý; bobule je velká, elipsovitě protáhlá, fialovomodrá s voskovým ojíněním
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Zář  
Konec doby zrání Zář

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)  
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá  
Faktor vody příliš suché půdy jsou méně vhodné  
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy  
Faktor půdy - vápnomilný ✓  
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení  
Řez na dlouhý tažeň i čípky  
Podnoží na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 či SO 4

## Užitné vlastnosti

---

Použití stolní odrůda - přímý konzum  
Choroby a škůdci odolnější k houbovým chorobám  
Plodnost středně pozdní, pravidelná (výnos 5-8 t/ha)

## Množení

---

Množení Roubování  
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací  
Popis vína dužnina bobule je masitá, vynikající ovocné chuti

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 126\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---



