

# Taxon *Staphylea pinnata*

Název taxonu	Staphylea pinnata
Vědecký název taxonu	Staphylea pinnata
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	klokoč zpeřený
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Staphylea</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Karpaty až Švýcarsko, Malá Asie, Kavkaz, Sýrie, u nás je původní v teplých oblastech Moravy

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř nebo menší strom
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý keř nebo menší strom, 1,5-5 m vysoký
Výhony	letorosty lysé
Pupeny	vstříčné
Listy	listy lichospeřené, lístků 5-7, jsou eliptické až vejčité, 5-10 cm, zašpičatělé, jemně ostře pilovité, rub šedozelený
Květenství	květy v nících latách, 5-12 cm
Květy	květy 7-12 mm, koruna žlutobílá až načervenalá, kališní lístky bělavé, báze zelenavá, špička červená
Plody	tobolka kulovitá až hruškovitá, 3-4 cm, 2-3laločná

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-II, teplomilná

Faktor vody	vlhké až středněvlhké půdy
Faktor půdy	středně živné kamenité půdy, milují vápník
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## **Užitné vlastnosti**

---

Období hlavního estetického...	V-VI - květ, později plody
Použití	uplatňuje se jednotlivě nebo i v malých skupinách v zahradních, parkových i krajinných úpravách

## **Množení**

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Hřížení
Množení - poznámka	Staphylea se množí semenem, silné sazenice dostaneme i hřížením, popřípadě můžeme množit zelenými řízky