

# Taxon *Vitis vinifera* Cab mitos

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Cab mitos
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	‘Cabernet Mitos’ (CMi)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	We 70-77-4F
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o německou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Frankovka’ x ‘Cabernet Sauvignon’

## Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávajíc
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, spíše celokrajné s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý překrytý s průsvitem; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý kuželovitý hrozen, středně hustý; má středně velké kulaté bobule, modrofialové barvy
Semena	středně velké, hruškovité, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vhodné jsou i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

## Užitné vlastnosti

---

Použití	modrá moštová barvířková odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	odolná k houbovým chorobám
Plodnost	raná, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

## Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je lehčí, ovocné až jemně kabinetové příchuti a velmi intenzivní sytě červené barvy
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 91)</a></li></ul>
--------------------------	--

## Ostatní

---

Odkazy	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul>
--------	---

## Grafické přílohy

---

