

# Taxon Vitis vinifera Nero

Název taxonu	Vitis vinifera Nero
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Nero´ (Ner)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	BG 15
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o maďarskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Villard Blanc (SV 12 375)´ x ´Gardonyj´

## Zařazení

---

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	modrá stolní odrůda révy
Životní forma	Fanero fy t

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, tři až pětilaločnaté, s mírnými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký hrozen, kuželovitý, středně hustý až hustý; bobule je velká, mírně oválná, tmavěmodrá s voskovým ojíněním
Semena	středně velká, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	snáší i sušší půdy
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň i čípky
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či T 5C

## Užitné vlastnosti

---

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	odolná k houbovým chorobám
Plodnost	raná, pravidelná (výnos 6-10 t/ha)

## Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, neutrální až sladké chuti

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 126)</a></li></ul>
--------------------------	---

## Ostatní

---

Odkazy	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul>
--------	---

## Grafické přílohy

---

