

# Taxon Prunus armeniaca 'Rival'

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu                   | Prunus armeniaca 'Rival'                     |
| Vědecký název taxonu           | Prunus armeniaca                             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                           |
| Odrůda                         | 'Rival'                                      |
| Český název                    | meruňka obecná                               |
| Autor                          | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Prunus</a>                       |

## Zařazení

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| Fytopcenologický původ | W1-24 ('Tilton' x 'Riland') x 'Perfection' |
| Pěstitelská skupina    | Peckovina                                  |

## Popisné a identifikační znaky

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Habitus          | vzrůstná koruna   |
| Listy            | středně velké   |
| Květy            | velké jako VP, okrouhlé, bílé, blizna v úrovni prašníků                                 |
| Opylovací poměry | Cizosprašná   |
| Plody            | velké, oválné, žluté s červeným líčkem, pevné, dužnina jemné chuti, nízký obsah kyselin |

## Doba kvetení

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Doba kvetení - poznámka | raná |
|-------------------------|------|

## Doba zrání

---

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Doba zrání - poznámka | 3 až 5 dní po 'Wenatchee' |
|-----------------------|---------------------------|

## Nároky na stanoviště

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje slunečná místa                             |
| Faktor tepla             | malé nároky na pěstování                            |
| Faktor vody              | středně náročná na závlahu                          |
| Faktor půdy              | optimální pH 5,5-8,0, nejlépe písčito-jílovitá půda |

## Užitné vlastnosti

---

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Použití          | sušení, přímý konzum, konzervace |
| Choroby a škůdci | napadána řadou škůdců            |

Plodnost vysoká

## Množení

---

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -  
Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

## Grafické přílohy

---

