

# Taxon *Vitis vinifera* Cab franc

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Cab franc
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	‘Cabernet Franc’ (CF)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Grosse Vidure, Cabernet Franco
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	pochází z Francie patrně z oblasti Bordeaux, přesné křížení není známo, předpokládá se, že jde o genetickou „matku všech kabernetů“

## Zařazení

---

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	dle vedení, má střední bujný růst s řidším olistěním
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávajíc
Pupeny	menší až středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté, hluboce lyrovitě vykrajované, bazální výkroj je většinou otevřený; povrch listu je vrásčitý, tmavě zelený, spodní strana listu je plstnatá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý hrozen, spíše řidší; bobule je malá, kulatá, tmavě modré barvy
Semena	menší až středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Cabernet Sauvignon (CF mívá řidší hrozen a větší listy)

Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

### Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

### Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

### Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	snáší i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	do sušších a vápenějších půd Fercal a CR 2, pro úrodné půdy a vyšší tvary Kober 125 AA

### Užitné vlastnosti

---

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	citlivá k houbovým chorobám, odolnější k plísni šedé
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 5 - 8 t/ha)

### Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno má rubínovou barvu a specifickou odrůdovou chuť jako Cabernet Sauvignon, ale jemnější
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, rosé, kupáže, barrique

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113, 114\)](#)

## Grafické přílohy

---

