

# Taxon *Prunus armeniaca* 'Vemina'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Vemina'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Odrůda	'Vemina'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Slovensko

## Zařazení

---

Fytocenologický původ kříženec 'Rakovského' x 'Arzami' x 'Zard'  
Pěstitelská skupina Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus středně vzrůstná, vytváří rozložitě koruny; květní pupeny jsou rozloženy na trnech i na jednoletém dřevě  
Plody kulovité, středně velké až velké (50-60 g), souměrné, základní barva slupky je oranžová, překrytá výrazným červeným líčkem, hladká, dužnina je světle oranžová s přechodnou texturou, pevná, dobře oddělitelná od pecky, chuť je velmi dobrá, sladká s typickým aroma, plody jsou mimořádně pevné a dobře snáší i delší přepravu

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka středně brzy, kvete dva dny před 'Velkopavlovická'

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka zraje 1-4 dny po odrůdě 'Velkopavlovická', středně raná odrůda

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla středně odolná proti mrazu v květu, vhodná do všech meruňkářských oblastí  
Faktor půdy bez speciálních nároků

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Podnož dle stanoviště vhodná všechny podnože

## Užitné vlastnosti

---

Použití především konzervace, dále přímý konzum  
Choroby a škůdci zdravotní stav stromů je velmi dobrý, mimořádná náchylnost na výskyt houbových chorob nebyla zjištěna  
Plodnost středně raná, stabilnější úrody dává na lokalitách s pozdějším nástupem vegetace

## Množení

---

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Staniční zkouška 17\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka Patří k odrůdám s raným začátkem kvetení a pozdějším termínem dozrávání plodů. Plody se vyznačují velmi dobrou chutí, dobře snášejí transport.

## Grafické přílohy

---

