

Taxon *Quercus cerris*

Název taxonu	Quercus cerris
Vědecký název taxonu	Quercus cerris
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	dub cer
Synonyma (zahradnický pou..	Quercus austriaca Willd.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Quercus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom až 35 m vysoký, velmi variabilní tvar koruny, celkově spíše užší
Výhony	pýřité, nebo žluto - šedě plstnaté, hranaté
Pupeny	kryté četnými, střechovitě uspořádanými šupinami, postranní i koncové pupeny s dlouhými nitkovitými, vytrvávajícími palisty
Listy	opadavé, eliptické až podlouhlé, 6 - 12 cm dlouhé, se 4 - 9 připíchatělými laloky, mají krátké řapíky a zpeřenou nervaturu, hrubě zubaté až peřenosečné, líc lesklý tmavozelený, drsně chlupaté, rub žlutozelený, hvězdovitě pýřitý
Květenství	jehnědy
Květy	samčí jsou drobné, v přetřhovaných, nících jehnědách, samičí květy jednotlivé, tvoří po dvou nebo ve větším počtu jehnědy
Plody	žalud ponořen v číšce do poloviny, číška s odstálými, štětinkovitými šupinami
Kůra a borka	v mládí tmavošedá, nazelenalá, později šedá, hrubě rozpukaná borka, v prasklinách rezavý
Možnost záměny taxonu (+..	druh charakteristický vytrvalými šídlovitými palisty u pupenů
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	žaludy lze sklízet po opadání nebo i dříve setřásáním ze stromů
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla	vyžaduje slunné polohy, jinak středně světlomilný
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	náročný na teplo, oblasti I-II, choulostivý na silné mrazy, snadno praská
Faktor vody	značně odolný k suchu
Faktor půdy	roste na vápenitém stanovišti, snáší dobře i kyselá, mělká a chudá podklady
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití	do smíšených skupin nebo jako jejich předsadba i jako solitera, v jižních oblastech vhodný i do krajiny
Růstové i jiné druhově spec..	krásný parkový strom, jemná textura

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka	roubováním se rozmnožují kultivary, jako podnož slouží původní druh Q, cerris, který slouží i jako podnož pro stálezelené druhy
Odrůdy	‘Argenteovariegata’ - má listy na okraji široce a nepravidelně žlutobíle lemované

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Velký okruh / Zámecký park v Lednici](#)