

Taxon *Muscari armeniacum*

Název taxonu	Muscari armeniacum
Vědecký název taxonu	Muscari armeniacum
Jména autorů, kteří taxon p...	Leichtlin ex Baker
Český název	modřelec arménský
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Muscari

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po...	Balkán, Řecko, Turecko, Kavkaz, vyskytuje nejčastěji na travnatých úbočích hor.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Díky výrazně modré barvě květů je druh ideální na výsadby do skupin s ostatními na jaře kvetoucími cibulovinami především s narcisy a žlutě a oranžově kvetoucími tulipány. Je možné z nich vysadit i obruby záhonů, kombinovat je s trvalkami, nechat je zplanět v trávníku i pod skupinami dřevin. Používají se také k výsadbám do nádob a k rychlení.

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Kořeny jsou svazčité.
Pupeny	Pupeny jsou umístěny na podpučí cibule.
Listy	Jedná se o velmi variabilní druh. Listy má čárkovité, žlábkovitě prohnuté, 0,2-1 cm široké, polovzpřímené až poléhavé. Z jedné cibule vyrůstá hned několik (4-8) bezlistých květních stonků vysokých 15-25 cm.
Květenství	Drobné kvítky soudečkovitého tvaru a modré barvy jsou uspořádány v hroznu kuželovitého tvaru. Okraje kvítků jsou světlejší, bílé nebo světle modré. Rozkvétá v dubnu a slabě voní.
Květy	Jsou soudečkovitého tvaru a modré barvy a jsou uspořádány v hroznu kuželovitého tvaru. Okraje kvítků jsou světlejší, bílé nebo světle modré. Květy slabě voní nasládlou vůní.

Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	Třípouzdrá tobolka.
Semena	Drobná černá.
Vytrvalost	Velmi dobře vytrvalý druh.
Dlouhověkost	Dlouhověký, na stanovišti vydrží bez přesazování i několik desítek let.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)
Doba rašení - poznámka	U tohoto druhu raší listy již na podzim a vytrvávají přes zimu až do jara. Na jaře vyrůstají další listy a na konci března a v dubnu vyrůstají květenství.

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	Třípouzdré tobolky dozrávají v květnu, po dozrání se otevřou a vypadávají z nich černá semena.
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor půdy - poznámka	Druh je nenáročný na půdu.

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	V našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci.
Doporučený spon pro výsad..	10 x 10 cm

Množení

Množení - poznámka	Množí se dceřnými cibulkami - hlavně u odrůd, základní druh je možné množit semenem, které velmi dobře klíčí.
Odrůdy	Pěstuje se množství barevných i tvarových odrůd: 'Atlantic', 'Blue Pearl' - jasně modré, 'Blue Spike' - modrý plnokvětý, 'Cantab' - modrofialový, 'Fantasy Creation' plnokvětý zeleno-modrý, 'Saffier' s kulovitými kvítky na delších stopkách, 'Early Gigant', 'Christmas Pearl' - modrofialové a další.

Celky sbírek

- [C 2 c: záhon podél zdi budovy na straně k... / ZF - C -
Výsadby v okolí budovy C](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... C 2c: podzim 2015

Dodavatel C 2c: Jošt Import

Grafické přílohy



