

# Taxon *Cichorium intybus* var. *foliosum* f. *capitata*

Název taxonu	<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> f. <i>capitata</i>
Vědecký název taxonu	<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> f. <i>capitata</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L., Hegi</a>
Český název	čekanka salátová hlávková
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	var. <i>foliosum</i> forma <i>capitata</i>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Cichorium</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Evropa, Asie a severní Afrika, současná kulturní forma Itálie

## Zařazení

Pěstitelská skupina Dvouletka pravá a Listová a stonková zelenina

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	růžice listů tvořící různé hlávky
Kořen	plytká kořenová soustava, kulový kořen krátký
Listy	dle typu odrůdy
Vytrvalost	dvouleté

## Doba zrání

Doba zrání - poznámka sklízí se za 2 - 3 měsíce od výsadby

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nenáročný, roste již při 4 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 5 °C, klíčí při 16 - 20 °C, při 25 °C se snižuje klíčivost a nad 30 °C neklíčí
Faktor půdy	středně těžké, humózní, propustné s dobrou strukturou a s dobrou vodní jímavostí

## Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	okrajová nekróza listů, virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), padlí čekanky ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )

Doporučený spon pro výsad.. červené typy 0,3 - 0,45 x 0,25 m, typ Zuckerhut 0,4 - 0,5 x 0,3 m

## Množení

---

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)