

Taxon *Tetragonia tetragonioides*

Název taxonu	<i>Tetragonia tetragonioides</i>
Vědecký název taxonu	<i>Tetragonia tetragonioides</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Pallas) Kuntze
Český název	Novozélandský špenát (čtyřboč rozložitá)
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Tetragonia expansa</i> Murr.
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Tetragonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Austrálie, Nový Zéland

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička nepravá a Listová a stonková zelenina

Popisné a identifikační znaky

Kořen	mohutný kořenový systém
Výhony	bohatě větvené, na průřezu čtyřhranné délky 1 m
Listy	krátce řapíkaté dužnaté trojúhelníkovitého tvaru
Květy	drobné žluté nebo žlutozelené v paždí listů
Plody	čtyř - až osmirohé nažky s několika dutinkami a 3 - 5 semeny
Vytrvalost	jednoleté

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	slunné polohy
Faktor tepla	teplé polohy, citlivý na nízké teploty, kritické pod 2 °C, optimum klíčení 20 °C
Faktor půdy	kyprá, záhřevná, dostatečně humózní, vododržná, pH 6 - 7,5

Užité vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), plíseň špenátu (<i>Peronospora spinaciae</i>), skvrnitost listů špenátu (<i>Cladosporium variable</i> var. <i>spinaciae</i>), mšice maková (<i>Aphis fabae</i>), květílka řepná (<i>Pegomyia hyoscyami</i>), maločlenec čárkovitý (<i>Atomaria linearis</i>)

Doporučený spon pro výsad.. 0,8 - 1 x 0,45 - 0,6 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)