

Taxon Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu | Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' |
| Vědecký název taxonu | Calamagrostis x acutiflora |
| Jména autorů, kteří taxon p... | (Schrad.) Rchb. |
| Odrůda | 'Overdam' |
| Český název | třtina ostrokvětá |
| Synonyma (zahradnický pou.. | Calamagrostis epigejos (L.) Roth 'Stricta'; C. arundinacea (L.) Roth 'Purpurea', C. stricta hort., C. |
| Autor | Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Nadřazená kategorie | Calamagrostis |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony | Kulturní původ |
| Biogeografické regiony - po.. | mezidruhový hybrid dvou domácích druhů C.epigejos (L.) Roth x C. arundinacea (L.) Roth. V kultuře pojmenován na počest významného německého šlechtitele a pěstitele trvalek Karl Foerster (1874 - 1970) |

Zařazení

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Trvalka zatahující |
| Životní forma | Hemikryptofyt |
| Zařazení podle původu, nár.. | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus | Stébelnatá tráva tvořící úhledné, tvrdě vzpřímené, husté trsy. Netvoří oddenky. V době květu pouze kolem 120 cm. Celkově slabší růst než odrůda 'Karl Foerster' |
| Kořen | svazčitý kořen |
| Výhony | stábla vzpřímená, pevná, řídce olistěná, zelená, napodzim spolu s listy barvící do žluta |
| Listy | husté, svěže zelené, před metáním cca 50 - 70 cm dlouhé a 2 cm široké, na okraji drsné, s podélným bílým panašováním. |
| Květenství | zpočátku načechralé, později velmi úzce stažené laty asi 20-25 cm dlouhé. Na počátku kvetení (kvete VII-VIII) stříbřitě fialové, později přecházejí do bronzově hnědé barvy |
| Plody | obilka |
| Možnost záměny taxonu (+.. | odrůda 'Karl Foerster' - nemá podélné bílé panašované listy a v |

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| | době květu je vyšší - cca do 150 - 170 cm |
| Vytřvalost | V našich klimatických podmínkách zcela mrazuvzdorná |
| Dlouhověkost | dlouhověká trvalka |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV) |
| Doba rašení - poznámka | brzy rašící a rychle se vyvíjející tráva |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Červenec |
| Konec doby kvetení | Srpen |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - polostín | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | ideální je plné slunce, k polostínu je tolerantní |
| Faktor tepla | V našich klimatických podmínkách zcela mrazuvzdorná |
| Faktor vody | nemá vyhraněné nároky, dobře roste v suché i vlhké půdě |
| Faktor půdy | propustná půda |
| Faktor půdy - poznámka | nemá vyhraněné nároky k pH |

Užitné vlastnosti

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | od června až do jara dalšího roku |
| Použití - pro trvalky | OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodně blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | solitera nebo menší skupiny - nechat vyniknout strmý vertikální růst |
| Doporučený spon pro výsad.. | 3 - 5 ks/m ² |

Množení

| | |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Množení | Dělení trsů |
| Množení - poznámka | dělení provádíme brzy na jaře před rašením |

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2010

Výsev/výsadba na stanoviš... XI/2010

Dodavatel Vodní zahrada Komořany

Grafické přílohy

