

Taxon *Vitis labrusca* 'Isabella'

Název taxonu	<i>Vitis labrusca</i> 'Isabella'
Vědecký název taxonu	<i>Vitis labrusca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	'Isabella' (Is)
Český název	réva liščí
Synonyma (zahradnický pou..	Izabela, Fragola, Bellina, Constantia, Black Cape, Capwein
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o amerického křížence mezi <i>Vitis labrusca</i> (réva liščí) x <i>Vitis vinifera</i> (réva vinná)

Zařazení

Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké až velké, pavézovité, trojlaločnaté, většinou s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch mírně vrásčitý, vespod silně bíle plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký, spíše válcovitý hrozen, volnější, na krátké stopce; bobule je středně velká až velká, kulatá až mírně oválná, tmavomodré později až skoro černé barvy, ojíňená
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou lehčí výsušné a vápenité půdy
Faktor půdy	úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vysoké i střední vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez
Podnož	do horších půdních podmínek Kober 125 AA i 5 BB, do úrodnějších půd CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba burčáku i lehčího červeného vína
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, napadána plísní révouou a červenou spálou
Plodnost	středně pozdní až pozdní, pravidelná (výnos 8-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je slaběji rubínově červené, silně aromatické vonící po lesních jahodách, které později ovšem hořkne a získává příchutě "po liščině"
Doporučená technologie vína	burčák, stolní, jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 27)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

