

# Taxon *Vitis vinifera* Rinot

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Rinot
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	‘Rinot’ (Ri)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	BV 67-6-6
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	česká odrůda, vznikla křížením odrůd ‘Merzling’ x (‘Villard blanc’ x ‘Rulandské šedé’)

## Zařazení

---

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavěji hnědé až červenohnědé, dobře vyžívající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, pětiúhelníkové, pětilaločnaté se středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je tmavěji zelený, velmi lehce vrásčitý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, válcovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá, malá až středně velká, zlatožlutá, při přezrávání s hnědavým líčkem a tečkou po blizně
Semena	středně velká až velká, hruškovitá, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech

Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

### Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

### Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

### Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	SO 4, CR 2, Kober 5 BB i Kober 125 AA, dle vedení a půdních podmínek

### Užitné vlastnosti

---

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	vyšší odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 7-13 t/ha)

### Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	vůně vína je ovocná, jemně kořenitá; chuť je také ovocná až bylinná
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže

### Celky sbírek

---

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 122\)](#)

## Grafické přílohy

---

