

Taxon *Achillea collina*

Název taxonu	<i>Achillea collina</i>
Vědecký název taxonu	<i>Achillea collina</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Heimerl
Český název	řebříček chlumní
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Achillea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. evropský druh

Zařazení

Pěstitelská skupina Trvalka zatahující a Léčivá rostlina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	0,15 - 0,70 m
Výhony	rýhovaná lodyha, přímá, větvená, chlupatá, načervenalá
Listy	zelené, zřídka šedozelené, přisedlé; prostřední lodyžní i přímo odstálé, v obrysu kopinaté, 2 až 3x peřenosečné, úkrojky často střídavé
Květenství	úbor v ploché choholičnaté latě
Květy	jazykové květy bílé (zřídka bledě růžové), tetraploidní
Plody	nažka bez chmýru
Vytrvalost	vytrvalá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor půdy	výhřevné, suché, zásadité, písčité, kamenité, hlinité, pH zásadité

Užitné vlastnosti

Použití	léčivá rostlina
Doporučený spon pro výsad..	1 ha - 65 000 ks

Množení

Množení Přímý výsev, Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka z předpěstované sadby v procesu šlechtění

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(genofond Achillea\)](#)