

Taxon *Dypsis lutescens*

Název taxonu	<i>Dypsis lutescens</i>
Vědecký název taxonu	<i>Dypsis lutescens</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Wendl.) Beentje et Dransf.
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H. Wendl., <i>Areca lutescens</i> Bory; <i>Areca borbonica</i> hort.; <i>Chrysalidocarpus glaucescens</i> Waby
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Dypsis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Madagaskarská oblast
Biogeografické regiony - po..	Madagaskar

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom stálezelený a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatě rostoucí stálezelená palma; dorůstá do 2-4(-9) m
Výhony	vytváří skupiny 6-10 štíhlých, žlutavých kroužkovaných kmínků, nesoucích elegantní obloukovitě přepadavé listy
Listy	tmavě zelené na dlouhém stonku, na průřezu kulaté; 1x sudozpeřené; úkrojek není zmáčkнутý a nemá žlábek, koncový úkrojek ve tvaru písmena V; pochvy listu hladké, červenohnědě skvmité, ojínné, lístky čárkovitě kopinaté, až 60 cm dlouhé, tuhé, asi ve 40-60 párech, střední žebra a vřetená na slunci zlatožlutá
Květenství	úžlabní lata, až 60 cm dlouhá
Květy	květy jsou jednopohlavné, jeden květ samičí vždy obklopují 2 květy samčí; samčí květy mají volné kališní lístky, krátce srostlou korunu; tyčinek je 6; pistillodium je přítomno; samičí květy mají kalich i korunu volnou, 6 staminodií a gyneceum s jediným vajíčkem a trojlaločnou bliznou
Plody	peckovice, vejčité nebo elipsoidní, 2-2,5 cm dlouhé, za zralosti zlatožluté až červené
Kůra a borka	zpočátku stonky obalené žlutými listovými bázemi

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé stanoviště, ne přímé slunce
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; celoročně optimální teplota 16-22 °C
Faktor vody	stále stejnoměrná vlhkost půdy, nesmí vyschnout; snáší velmi dobře suchý vzduch
Faktor půdy	živná humózní půda; pH 5,0 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	soliterní rostlina pro celé spektrum interiérů; velmi vhodná pro hydroponii
Choroby a škůdci	mšice, puklice, svilušky, třásněnky, vlnatky

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka	semena klíčí 2-3 měsíce

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"> • S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	--

Ostatní

Poznámka	Známa pod různými lidovými jmény - např. areka; chrysalidokarpus nažloutlý; zlatoplodá palma
Odkazy	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.tropicos.org/Name/2400093?tab=references • http://botany.cz/cs/dypsis-lutescens/ • http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=10956