

Taxon Vitis vinifera Kutuzovskij

Název taxonu	Vitis vinifera Kutuzovskij
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Kutuzovskij’ (Ku)
Český název	Réva vinná pravá
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Coarna neagra (Moldavskij)’ x ‘Dattier de Saint-Vallier (SV 20 365)’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	modrá stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	velké, pětilaločnaté s mírně hlubokými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu spíše hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký až velmi velký hrozen, kuželovitý, křídlatý, hustý; bobule je velká, elipsovitě protáhlá, tmavě fialovomodrá
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažen i delší čípky
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 či SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, citlivější k plísni šedé
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 5-10 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je chruplavá až masitá, chuť neutrální

Celky sbírek

- Celky sbírek v areálu ZF
- [V / ZF - V - vinice \(řádek 126\)](#)

Ostatní

- Odkazy
- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf