

Taxon *Ulmus minor*

Název taxonu	<i>Ulmus minor</i>
Vědecký název taxonu	<i>Ulmus minor</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Mill. emend. Richens
Český název	jilm habrolistý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Ulmus carpiniifolia</i> Ruppert ex Suckow
Autor	Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D. (ing._p_emysl_krej_i_k_ph.d.@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ulmus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	Domácí; Evropa, severozápadní Afrika, Malá Asie, Kavkaz.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Strom 15-30 m vysoký, koruna široce vejčitá, kořenové výmladky, u starších jedinců uzlovité výrůstky na kmenech.
Výhony	Letorosty lysé nebo jen řídce chlupaté, některé typy mají větvičky s korkovými lištami.
Pupeny	Jednobarevné, tmavé.
Listy	Elipčité až obvejčité, 12-14 párů nervů, líc lesklý, lysý, rub lysý, krátce řapíkatý; listy na výmladcích řídce drsně štětinatě chlupaté.
Květenství	V hustých svazečcích, tmavě červené, téměř přisedlé; II-III.
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	Nažky se semenem u horního okraje elipčitého křídla, 1-2 cm dlouhé, lysé, přisedlé; velmi brzy opadávají.
Kůra a borka	Šedohnědá, rozbrázděná, některé typy mají vystouplé korkovité lišty.
Možnost záměny taxonu (+..	<i>Ulmus laevis</i> - listy na rubu hustě chlupaté, líc roztroušeně chlupatý až lysý, 15-20 párů žilek; pupeny dvoubarevné. <i>Ulmus glabra</i> - listy někdy se třemi výraznými zuby, líc drsný, rub řídce chlupatý, 12-14 párů nervů; větvičky někdy s korkovými lištami. <i>Ulmus pumila</i> - listy lysé, 10-12 párů nervů, listy jsou výrazně dvojřadě uspořádané;

	konce větví převisají.
Dlouhověkost	Středněvěká rostlina.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Březen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	Oblast I-III.
Faktor vody	suchovzdorný, ale roste i v lužních polohách.
Faktor půdy - poznámka	hlubší živné půdy, lužní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	Spíše nenápadný strom, hezké jsou korkové lišty na větvičkách mladých jedinců.
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	Do krajiny, doplňková dřevina do parků, ale díky grafióze se téměř nevysazuje.
Choroby a škůdci	grafiosa jilmů

Množení

Množení	Přímý výsev
Množení - poznámka	Výsevem semen hned po dozrání.
Odrůdy	var. suberosa (Moench.) Rehd. - malý stromek, korkovité lišty spíše na starších výhonech, list řídce chlupatý.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - nespecifikováno / Zámecký park v Lednici](#)

Ostatní

Stáří vzorku 30 let

