

Taxon Hippophae rhamnoides

Název taxonu	Hippophae rhamnoides
Vědecký název taxonu	Hippophae rhamnoides
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	Rakytník řešetlákový
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hippophae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Čína, Mongolsko, Sibiř

Zařazení

Pěstitelská skupina Drobné ovoce

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tvoří přechod mezi keřem a stromem, habitus rozložitý
Květy	v podobě okolíku bez korunních plátků, žlutozelené, květy nemají nektarium a nenavštěvují je včely ani jiný hmyz (větrosnubné)
Plody	malé (0,4 - 0,5 g), vejčité až oválné, tmavě oranžové, šťavnaté, mírně kyselé až sladkokyselé, obsahují 60-180 mg vitamínu C na 100 g plodů

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka závisí na povětrnostních podmínkách na jaře (začíná při teplotě 6-10°C)

Doba zrání

Doba zrání - poznámka druhá polovina srpna

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce mrazuodolná
Faktor vody	hladina podzemní vody smí být maximálně 0,6 m pod povrchem půdy
Faktor půdy	bez větších nároků, nejlépe lehké, písčito-hlinité půdy s vysokým obsahem humusu (pH = 6,5-7,0) a fosforu

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez v prvních letech vyžaduje mírný prosvětlovací řez

Užitné vlastnosti

Použití	zpracování, zmražení
Choroby a škůdci	netrpí chorobami, chemická ochrana pouze v případě přemnožení mšic
Plodnost	plodnost ve 3. - 4. roce po výsadbě, pravidelná, nutnost zastoupení samčích a samičích rostlin v poměru 1:6-8

Množení

Množení Bylinné řízky, Dřevité řízky, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Za technickými izoláty\)](#)

Ostatní

Poznámka nenáročná rostlina, vysoký obsah vitamínu C, protierozní a okrasná rostlina, obtížná ruční sklizeň

Grafické přílohy

