

# Taxon *Buddleja alternifolia*

Název taxonu	Buddleja alternifolia
Vědecký název taxonu	Buddleja alternifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Maxim.</a>
Český název	komule střídavolistá
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Buddleja</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	severozápadní Čína

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	jemný opadavý keř 2-4 m vysoký, s široce rozkladitými převislými větvemi
Výhony	převisající, letorosty šedé, pýřité, později olysávající
Pupeny	střídavé
Listy	listy kopinaté, 3-10 cm dlouhé, na rubu šedobíle strupovitě plstnaté
Květenství	květy v hustých, asi 2,5 cm širokých svazečcích
Květy	květy modrofialové na loňských výhonech, voní
Plody	2pouzdré tobolky s četnými drobnými semeny
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	spíše slunné
Faktor tepla	teplejší oblasti - I (II)

Faktor vody	nenáročná, ale nemá ráda vlhčí půdy
Faktor půdy	živné ne příliš vlhké půdy

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez řez nevyžaduje, na jaře můžeme odstranit pouze odumřelé výhony

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	VI-VII - květ
Použití	můžeme ji na chráněném stanovišti použít i jako soliteru, jinak např. na svahy nebo jako předsadbu konifer, jsou cenné pro pozdní kvetení
Choroby a škůdci	netrpí

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Roubování a Roubování - Do rozštěpu
Množení - poznámka	Roubování: roubojeme na <i>B. davidii</i> , dostaneme tak rostliny, které začnou kvést o rok dříve než ze semene