Taxon K2 Krystal

Název taxonu	K2 Krystal
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Krystal´ (Kr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnicky pou..	C 43
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o maďarskou odrůdu, vznikla křížením odrůd (´V. amurensis´ x ´Thalloczy Lajos´) x ´Villard blanc´

Zařazení

Pěstitelská skupina - pozná..	stolní bílá odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, výrazně červenohnědé barvy, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločnaté s mírně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, uzavřený; povrch listu je hladký až jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je malý až středně velký, kuželovitý, hustý; bobule je menší, oválná, zelenožlutá
Semena	malá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast)
Faktor vody	příliš suché půdy nejsou vhodné
Faktor půdy	hluboké, hlinitopísčité vlhčí půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na tažně, snáší i krátký řez
Podnož	do chudších půd Kober 125 AA, do vlhčích a humóznějších pak S0 4 či CR 2

Užitné vlastnosti

Použití	bílá stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	má vyšší odolnost k houbovým chorobám i mrazu
Plodnost	středně raná, pravidelná (výnos až 8-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitější, neutrální až sladší chuti

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- V / ZF - V - vinice (řádek 125)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy