

# Taxon K2 Krystal

Název taxonu	K2 Krystal
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Krystal´ (Kr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	C 43
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o maďarskou odrůdu, vznikla křížením odrůd (´V. amurensis´ x ´Thalloszy Lajos´) x ´Villard blanc´

## Zařazení

Pěstitelská skupina - pozná..	stolní bílá odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, výrazně červenohnědé barvy, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločnaté s mírně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, uzavřený; povrch listu je hladký až jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je malý až středně velký, kuželovitý, hustý; bobule je menší, oválná, zelenožlutá
Semena	malá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast)
Faktor vody	příliš suché půdy nejsou vhodné
Faktor půdy	hluboké, hlinitopísčité vlhčí půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na tažně, snáší i krátký řez
Podnož	do chudších půd Kober 125 AA, do vlhčích a humóznějších pak S0 4 či CR 2

## Užitné vlastnosti

---

Použití	bílá stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	má vyšší odolnost k houbovým chorobám i mrazu
Plodnost	středně raná, pravidelná (výnos až 8-12 t/ha)

## Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitější, neutrální až sladší chuť

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 125)</a></li></ul>
--------------------------	---

## Ostatní

---

Odkazy	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul>
--------	---

## Grafické přílohy

---

