

# Taxon *Vitis vinifera* Damascenka

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Damascenka                          |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                     |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                              |
| Odrůda                         | 'Damascenka' (Da)                                  |
| Český název                    | Réva vinná pravá                                   |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Ceaus belyj, Bicane, Panse jaune, Damaškový hrozen |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)            |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                             |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera   |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                              |

## Biogeografické regiony

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ  |
| Biogeografické regiony - po.. | starobylá odrůda neznámého křížení odněkud z Malé Asie (Damašek) nebo Balkánu |

## Zařazení

---

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fytcenologický původ          | původní odrůda          |
| Pěstitelská skupina           | Liána opadavá           |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | stolní bílá odrůda révy |
| Životní forma                 | Fanerofyt               |

## Popisné a identifikační znaky

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Habitus          | má středně bujný až bujný růst   |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající   |
| Pupeny           | středně velké, zašpičatělé   |
| Listy            | velké až velmi velké, pěti až sedmilaločnaté, s velmi výraznými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, uzavřený s průsvitem; povrch listu je vrásčitý, vespod plstnatý                            |
| Květenství       | lata   |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné  |
| Opylovací poměry | Samosprašná  |
| Plody            | hrozen velký, válcovitě kuželovitý, občas křídlatý, středně hustý, někdy volnější až řídký (závisí od opylení); bobule je velká, kulatá až mírně oválná, zpočátku bledě zelená, později zlatožlutá |
| Semena           | velká, s krátkým zobáčkem  |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech   |
| Vytrvalost       | ano  |
| Dlouhověkost     | ano  |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)  |

## Doba kvetení

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Říjen |
| Konec doby zrání   | Říjen |

## Nároky na stanoviště

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce   | ✓   |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá     |
| Faktor vody              | příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné                |
| Faktor půdy              | hlinité či hlinitopísčité půdy                            |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓   |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                       |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení  |
| Řez             | na dlouhý tažeň  |
| Podnož          | na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 i T 5C |

## Užitné vlastnosti

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Použití          | stolní odrůda - přímý konzum  |
| Choroby a škůdci | citlivá k houbovým chorobám i mrazům, sprchává, pokud nemá v okolí opylovače (kvete ženským květem) |
| Plodnost         | pozdní, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)   |

## Množení

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Množení            | Roubování   |
| Množení - poznámka | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací |
| Popis vína         | dužnina bobule je masitá, příjemné mírně muškátové chuti    |

## Celky sbírek

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 132)</a></li></ul> |
|--------------------------|---|

## Ostatní

---

|        |   |
|--------|---|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul> |
|--------|---|

## Grafické přílohy

---

