

Taxon *Sorbus domestica*

Název taxonu	<i>Sorbus domestica</i>
Vědecký název taxonu	<i>Sorbus domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	jeřáb oskeruše
Synonyma (zahradnický pou..)	<i>Pyrus sorbus</i> Gaertner – nom. illeg.; <i>Mespilus domestica</i> (L.) All.; <i>Pyrus d.</i> (L.) SM.; <i>Cormus d.</i> (L.) Spach
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Sorbus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina Listnatý strom opadavý
Životní forma Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus strom, 10 – 13 (-20) m, s dobře vyvinutým kmenem, koruna široce kuželovitá až široce vejčitá, někdy až kulovitá, okraj nepravidelný, košatý

Výhony olivově hnědé až červenohnědé, v mládí hustě jemně plstnaté, brzy olysávají

Pupeny 8 – 12 mm dlouhé, vejčité, špičaté, velmi lepkavé, lysé, na konci pýřité, zelené až světle hnědé

Listy zpeřené, s 11 – 21 lístky, ty jsou 3 – 8 cm dlouhé, vejčité až podlouhle vejčité, se symetrickou zaokrouhlenou bází, vrchol špičatý až přišpičatělý, okraj jednoduše velmi ostře pilovitý, ve spodní třetině celokrajný, líc matný, rub sivozelený, listy v mládí jemně bíle plstnaté, později na líci lysé, na rubu hl. podél žil vločkovitě plstnaté

Květy 6 – 10 cm široké, široce kuželovité, vřeteno plstnaté, květ až 18 mm v průměru, kališní cípy špičaté, poupata narůžovělá

Plody malvice, 15 – 40 mm dl., kulovité nebo hruškovité, žluté až hnědavé, někdy s oranžovým nebo červeným líčkem, ojíňené, hustě pokryté lenticelami, aromatické, trpké, požitelné až po

	přezrání
Kůra a borka	šedohnědá, podélně rozpraskaná
Možnost záměny taxonu (+..	plodem i listem charakteristický druh
Dlouhověkost	krátkověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	kvete v květnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	plodí v září až říjnu
-----------------------	-----------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilná dřevina snášející mírné přístínění
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplomilná, avšak mrazuvzdorná (snese i -30°C), oblasti I-(III)
Faktor vody	roste i na sušších stanovištích
Faktor půdy	půdy živné, zásadité, nejlépe vápenaté, hluboké
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	na podzim žluté až oranžovočervené
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	domácí, původně ovocná dřevina, plody zpracovávají do kompotů, pálenek a pod, vhodná i pro uličním stromořadí, použití v krajině, odolná v městském prostředí
Růstové i jiné druhově spec..	méně nápadný, ale krásný strom

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	roubujeme a očkujeme na <i>S. aucuparia</i>

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

