

Taxon *Buxus microphylla* 'Sunny Side'

| | |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu | <i>Buxus microphylla</i> 'Sunny Side' |
| Vědecký název taxonu | <i>Buxus microphylla</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Siebold & Zucc.) E.M. McClint. |
| Odrůda | 'Sunny Side' |
| Český název | zimostráz malolistý |
| Synonyma (zahradnický pou.. | <i>Buxus japonica</i> Müll. Arg. Ex Miq. |
| Autor | Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Vnitrodruhové jednotky | var. <i>Japonica</i> |
| Nadřazená kategorie | Buxus |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Čínsko-japonská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | kultivar vyselektován v Sunnyside Nurseries, Troy, Illinois, USA |

Zařazení

| | |
|---------------------|--|
| Pěstitelská skupina | Jehličnatý strom stálezelený a Léčivá rostlina |
| Životní forma | Fanerofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|----------------------------|---|
| Habitus | vzrůstný, široce kulovitý, 1-2 m vysoký |
| Výhony | lysé, ostře hranaté |
| Pupeny | vstřícné |
| Listy | jednoduché, celokrajné, kožovité lesklé, velké, (tmavě) zelené, v zimě jsou pouze lehce měďnatě či bronzově zbarvené, obkopynaté až obvejčité, 8 - 25 mm dlouhé, vrchlek zaoblený nebo vykrojený, čepel nejširší nad středem, špička listu je zpravidla srdčitě vykrojená |
| Květenství | hlávky v paždí listů |
| Květy | žlutozelené, nenápadné |
| Plody | tobolka, kulovitá |
| Semena | černá |
| Kůra a borka | šedohnědá |
| Možnost záměny taxonu (+.. | <i>Buxus sinica</i> - letorosty pýřitě |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Květen

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - polostín | ✓ |
| Faktor světla - stín | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | zmní slunce - poškození |
| Faktor tepla | oblast I.-II., Zóna 6a |
| Faktor vody | nenáročná, ne zamokřené půdy |
| Faktor půdy | neutrální - mírně zásadité, na půdy nenáročný, ale nemá rád příliš suché a příliš těžké půdy, snáší městské prostředí |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓ |

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez dobře snáší řez - vhodný k tvarování.

Užitné vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--|
| Období hlavního estetického... | celoročně |
| Použití | okrasný keř - skupiny, podrost, živé ploty, tvarování |
| Choroby a škůdci | Listové skvrnitosti zimostrázu (<i>Mycoshaerella patouillardi</i> , <i>Phyllosticta</i> , <i>Ascochyta buxicola</i> , <i>Hyponectria buxi</i>), rzivost a padlí (<i>Puccinia buxi</i> , <i>Phyllactinia guttata</i>), odumírání výhonů a zasychání listů (<i>Volutella buxi</i> , <i>Trochila buxi</i> , <i>Fusarium buxicola</i>), kořenové hniloby zimostrázu (<i>Phytophthora cinnamoni</i>), <i>Cylindrocladium buxicola</i> |

Množení

| | |
|--------------------|---|
| Množení | Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení, Dělení trsů, Množení oddělky, Množení odkopky a Roubování |
| Množení - poznámka | Nejpoužívanějším způsobem je řízkování, nejčastěji jde o množení vyzrálými řízky. Množení semenem je možné, u původního druhu - nevyrovnané potomství, méně častým způsobem je dělení, roubování. |

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice - 10. řada\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)