# Taxon Cucurbita maxima

| | |
|---|---|
| Název taxonu | Cucurbita maxima |
| Vědecký název taxonu | Cucurbita maxima |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Duch. |
| Český název | tykev velkoplodá |
| Autor | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Nadřazená kategorie | Cucurbita |

## Biogeografické regiony

| | |
|---|---|
| Biogeografické regiony - po.. | Amerika |

## Zařazení

| | |
|---|---|
| Pěstitelská skupina | Letnička pravá a Plodová zelenina |
| Zařazení podle původu, nár... | teplomilná zelenina |

## Popisné a identifikační znaky

| | |
|---|---|
| Habitus | plazivý |
| Výhony | stonek válcovitý |
| Listy | ledvinovitý tvar |
| Květy | žlutá až oranžová koruna |
| Plody | kulovitý, ploše kulovitý, turbanovitý, různe ozdobné tvary, barva dužniny oranžová |
| Semena | bíla s okrajem, HTS 130 - 160 g |
| Vytrvalost | jednoletá |

## Doba kvetení

| | |
|---|---|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení | Září |

## Doba zrání

| | |
|---|---|
| Začátek doby zrání | Červen |
| Konec doby zrání | Říjen |

## Nároky na stanoviště

| | |
|---|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor půdy | humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí, |

| | |
|---|---|
| | písčitohlinité, hlinité, pH 6,5 - 7,5 |

## Užitné vlastnosti

| | |
|---|---|
| Použití | zelenina |
| Choroby a škůdci | deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), antraknóza tykvovitých (Colletotrichum lagenarium), šedá hniloba, květilka všežravá (Hylemyia platura) |

## Množení

| | |
|---|---|
| Množení | Přímý výsev |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- P 1: pole - záhon nejblíže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole (dle osevního postupu)