

# Taxon *Prunus padus*

Název taxonu	Prunus padus
Vědecký název taxonu	Prunus padus
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	střemcha hroznovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Padus avium Mill., Prunus racemosa Lam., Prunus vulgaris Borkh.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
------------------------	--

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom někdy jen keř
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom (jen vyjímečně keř), vysoký 10 - 17 m, s kuželovitou, později však klenutější korunou
Kořen	srdčitý
Výhony	letorosty v mládí chlupaté, později hladké a lysé, leskle hnědé
Pupeny	velmi štíhlé a špičaté, přitisklé
Listy	obvejčitě nebo podlouhle eliptické, s krátkou, ale tenkou špičkou, na bázi obvykle téměř okrouhlé, 5-9 cm dlouhé a přibližně 3-7 cm široké, na okraji jemně pilovité, na líci matně tmavozelené, na rubu světlejší. Řapíky asi 2 cm dlouhé, s 1-3 terčovitými žlázkami
Květenství	štíhlý hrozen
Květy	bílé, v hroznech 7 - 12 cm dlouhých, většinou nících, složených z četných, asi 20 - 40 květů, kolem 18 cm dlouhých
Plody	kulovité nebo jen málo podlouhlé peckovice, asi 7 mm tlusté, černé, poněkud lesklé
Semena	pecka je pokryta malými důlky
Kůra a borka	hladká, velmi temně hnědošedá nebo téměř černá, rozemnutá nepříjemně páchne
Možnost záměny taxonu (+..	Prunus virginiana (plody červeno-černé, pecička hladká, list vespod

	namodralý)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Červen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla	světломilný, snáší zástín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	dokáže růst v podrostu
Faktor tepla	otuzilá dřevina, oblasti I-IV, vůči klimatickým extrémům je velmi odolná
Faktor vody	vyžaduje dostatek půdní vláhy, dává přednost polohám s vysokou hladinou spodní vody
Faktor půdy	hluboké půdy, velmi bohaté na živiny
Faktor půdy - poznámka	nesnese kyselé a zrašelinělé

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	na podzim žlutě barví
Použití	v parcích jen jako podrost v krycích skupinách na vlhkých místech, pro krajinářské úpravy
Růstové i jiné druhově spec..	velmi vonné a krásné květy, podzimní zbarvení žluto-oranžové, snese znečištěné ovzduší

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním, kultivary roubojeme na P. avium
Odrůdy	‘Colorata’ - velký keř, nebo stromek, výhony a listy tmavě purpurové přes celou sezónu, kvete růžově v dubnu; ‘Nana’ - 3 - 4 m vysoká, zakrslá hustá, listy menší než u druhu, kvete bohatěji než druh; ‘Plena’ - květy velké poloplňné, kvete dlouho; ‘Summer Glowe’ - strom nebo keřovitý strom, listy při rašení bronzově zelené, později purpurově hnědé

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Velký okruh / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - nespecifikováno / Zámecký park v Lednici](#)