

Taxon Cucurbita pepo

Název taxonu	Cucurbita pepo
Vědecký název taxonu	Cucurbita pepo
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	tykev obecná
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cucurbita

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Amerika

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nár... teplomilná zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	převážně keříčkový
Výhony	stonek pětihranný
Listy	dlanité, často s bílými skvrnami
Květy	žlutá až oranžová koruna
Plody	stopka plodů pětihranná, tvrdá, různé tvar plodů: cuketa - válcovitá, štíhlá, patizon - diskovitý, tykev špagetová - oválná, barva dužniny krémově bílá
Semena	bíla s okrajem, HTS 130 - 160 g
Vytrvalost	jednoletá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen
Konec doby kvetení Zář

Doba zrání

Začátek doby zrání Červen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor půdy humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí, písčito hlinité, hlinité, pH 6,5 - 7,5

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), antraknóza tykvovitých (Colletotrichum lagenarium), šedá hniloba, květílka všežravá (Hylemyia platura)

Množení

Množení	Přímý výsev
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)