

Taxon *Euonymus verrucosus*

Název taxonu	<i>Euonymus verrucosus</i>
Vědecký název taxonu	<i>Euonymus verrucosus</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Scop.
Český název	brslen bradavičnatý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Euonymus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína, jihovýchodní Tibet

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý keř vzpřímeně nebo vystoupavě stavěný, výška 1-3 (5) m
Výhony	větve jemně načernale korkovitě bradavičnaté
Pupeny	vstřícné
Listy	listy vejčitě kopinaté, eliptické nebo vejčitě, zaspíchatělé, 2-6 cm, vroubkovaně pilovité
Květenství	úžlabní vidlany po 3-7 květech
Květy	květa nahnědlé, vonné, stopky mají tenké, 2-3 cm
Plody	plody žlutočervené, 6 mm široké, míšek červený, semeno černé
Semena	černé
Dlouhověkost	krátkověká dřevina

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	může kvést již od května

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	snese stín
Faktor tepla	oblast I-II (na vápencích až do III)
Faktor vody	suchovzdorný
Faktor půdy	živná, hlinitohumózní půda
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VI - květ, voní, VIII-IX - plody
Použití	v krajině, podrostová dřevina, vhodný na tvarování

Množení

Množení	Předpěstování sadby
---------	---------------------