

Taxon *Prunus armeniaca* 'Vestar'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Vestar'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Vestar'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Slovensko

Zařazení

Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna rozložitá, řídká
Květy	větší než 'Velkopavlovická', bílé, okrouhlé, blizna nad úrovní prašníků
Plody	středně velké až velké (45 až 50 g), srdcovité se zaobleným vrcholem, souměrné, základní barva světle oranžová s celistvým bledě červeným líčkem na slunečné straně, dužnina oranžová, tuhá, středně šťavnatá, velmi dobrá aromatická chuť, v nepříznivých letech je dužnina přilnavá k pece, tuhá dužnina se při sběru a přepravě neotlačí, plody jsou dobře skladovatelné

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka střední

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 5 dnů po odrůdě 'Velkopavlovická' (Ø 22. 7.), středně raná odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce odolná proti nízkým teplotám
Faktor půdy	nenáročná na polohy, půdy výživné, vlhké

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož dle podmínek lze využít všechny podnože

Užitné vlastnosti

Použití	především přímý konzum (tuhost dužniny, velmi dobrá chuť)
Choroby a škůdci	náchylná k monilii
Růstové i jiné druhově spec.	mírně vzrůstná
Plodnost	vstup do plodnosti je středně raný, plodný potenciál odrůdy je vysoký

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

